

## Overzicht contactmomenten en screening (uit medische richtlijn voor kinderen met Downsyndroom)

Overzicht van de aanbevolen minimale frequentie van contactmomenten. De contactmomenten op indicatie zijn hierin niet weergegeven.

Zorgverlener	Leeftijd	Frequentie	Opmerkingen
Kinderarts	0 tot 18 jaar	1x per jaar	Coördinatie van zorg voor downsyndroom
Downteam/poli*	0 tot 10 jaar	1x per jaar	
	>10 jaar	1x per 2 jaar	
KNO-arts	0 tot 5 jaar	1 tot 2x per jaar	Inclusief gehoorscreening
	> 5 jaar	1 tot 2x per 2 jaar	
Oogarts	0 tot 2 maanden	Eenmalig	
Orthoptist	0 tot 6 jaar	Bij 1, 3, 4 en 6 jaar	
	> 6 jaar	Iedere 4 à 5 jaar	
Tandarts	0 tot 18 jaar	2x per jaar	Bij 6, 9, 12 en 15 jaar röntgendiagnostiek
	> 6 jaar	Bij 6 jaar	
(Kinder)fysiotherapeut	< 3 maanden		Eerste contact
(Pre-)Logopedist	< 1 jaar		Eerste contact
JGZ-team	0 tot 18 jaar	Conform JGZ-basistakenpakket	Inclusief vaccinaties
AVG	≥ 18 jaar		Reguliere zorg voor downsyndroom

### \*Contact met zorgverleners in gecoördineerd verband, bij voorkeur een multidisciplinair Downteam

Overzicht van de minimaal benodigde specifieke screeningstesten, aangevraagd door de kinderarts. Standaard screenend (lichamelijk) onderzoek is hierin niet weergegeven.

Aandoening	Leeftijd	Frequentie	Screening
Hartafwijking	0 tot 4 weken		Hartecho
Schildklierstoornis	1 jaar	In 1 <sup>e</sup> levensmaand, bij 6 en 12 maanden	TSH, vrij T4
	> 1 jaar	1x per jaar	TSH, vrij T4
Coeliakie	< 2 jaar	Optioneel	HLA-DQ2 en -DQ8
	> 2 jaar	1x per 2 jaar*	IgA en IgA tTGA
Heupafwijking	Vanaf moment dat het kind stabiel loopt	Eerste keer bij stabiel lopen	X-bekken

\* Indien HLA-DQ2 of -DQ8 positief of niet verricht is